

安全の確保

激しい腹痛
嘔吐

苦痛の緩和

- ・安楽な体位
- ・患者家族の不安の軽減

第一印象の把握：外観、A(気道)・B(呼吸)・C(循環)・D(意識)の評価

異常あり

医師へ
報告

緊急度が
高い

緊急を要する疾患

- ・腹部大動脈破裂
- ・大動脈解離
- ・肝、脾、腎破裂
- ・消化管穿孔
- ・上腸間膜動脈閉塞症
- ・異所性妊娠
- ・心筋梗塞

バイタルサイン(ABCD) 安定化

- ・気道確保
- ・酸素投与
- ・静脈路確保
- ・モニタリング

緊急処置・治療・検査

手術・IVR

異常なし

問診

主訴 痛み

- ・部位
- ・性状(内臓痛、体性痛、関連痛)
- ・発症様式(突発発症、増悪)

随伴症状(嘔吐、下痢、下血)

既往歴(高血圧、手術痕)

アレルギー、飲酒喫煙歴

飲食歴など

身体診察

- ・視診(腹部膨満、ヘルニア、手術痕)
- ・聴診(腸雑音)
- ・触診(反跳痛、筋性防御)

バイタルサイン

quickSOFA (2点以上で敗血症を疑う)

- ・GCS<14
- ・呼吸回数 ≥ 22 回/分
- ・収縮期血圧 ≤ 100 mmHg

医師へ
報告

検査

- ・血液検査・血液ガス分析
- ・12誘導心電図
- ・エコー
- ・腹部X線
- ・腹部CT

異常あり

異常なし

不定愁訴の可能性